

Titel: Hela klassifikationen ICD-10-SE giltig från 2025-01-01 (tsv)

Beskrivning: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE)

Utgivare: Socialstyrelsen

Kontaktuppgift: klassif@socialstyrelsen.se. Enheten för klassifikationer och terminologi, Avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå

Identifierare: OID: 1.2.752.116.1.1.1

Version: 2025-01-01

Antal rader inklusive rubrikrad: 82 489

Antal unika koder: 38 928

Filstruktur och filformat: Filen består av 16 kolumner. Den första raden innehåller rubriker på kolumnerna. En kod upptar en eller flera rader beroende på antalet egenskaper. Varje cellvärde omges av citat-tecken (") exempelvis "Akut hjärtinfarkt". Filformatet är en tab-separerad textfil (.tsv). Teckenkodningen måste vara UTF-8. Kolumndataformat är text. Cellvärden i kolumner som är av typen RICH_TEXT är i HTML-format för att alla formateringar ska följa med.

Kolumnrubrik/ Benämning på egen- skap	Datatyp	Beskrivning av innehållet i respektive kolumn/egenskap	Exempel på innehåll i respektive kolumn
Kod	TEXT	alfanumerisk benämning på kapitel, avsnitt, kategori, subkategori eller nationell fördjupning. Består av en unik kod eller ett kodintervall	I21.9
Giltig från	TEXT	Anger när koden börjat gälla i Sverige	1997-01-01
Överordnad kod	TEXT	överordnad kod som den aktuella koden sorterar under	I21
Titel	TEXT	språklig benämning på kod	Akut hjärtinfarkt
Latin	TEXT	latinsk benämning på titel	Infarctus myocardii acutus
Beskrivning	RICH_TEXT	beskrivning och förklaring av vad koden avser	Denna kategori skiljer sig från andra då den inkluderar störningar som karakteriseras inte bara av symtom och förlopp utan även inbegriper...
Exempel	RICH_TEXT	exempel på vad koden avser. OBS! För koder som har flera exempel återfinns de på separata rader	Taussig-Bings syndrom
Innefattar	RICH_TEXT	förtydligande information om vad som ingår i koden, är inte avsett att vara uttömmande. OBS! För koder som har flera innefattar återfinns de på separata rader	Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten
Utesluter	RICH_TEXT	förtydligande information om vad som <u>inte</u> ingår i koden. Utgör stöd för att avgränsa en kod från andra koder. OBS! För koder som har flera utesluter återfinns de på separata rader	Gammal hjärtinfarkt (I25.2)
Anmärkning	RICH_TEXT	stöd och vägledning vid kodning	Vid morbiditetskodning anges I22 för varje ny infarkt, oavsett lokalisation, som uppkommer inom 4 veckor (28 dagar) räknat från tidigare infarkts början
Kodningsinformation	TEXT	hänvisning till relaterade koder i aktuell klassifikation	Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel 20)
Innehåll	RICH_TEXT	information om vad kapitlet innehåller	Detta kapitel innehåller följande avsnitt: S00-S09 Skador på huvudet S10-S19 Skador på halsen...
Manifestation (*)/ Etiologi (t)	TEXT	anger om koden är en manifestationskod (anges med asterisk *) eller etiologisk kod (anges med dagger t)	Manifestationskod (*)

Koppling Manifestation (*)/ Etiologi (t)	TEXT	anger kopplad manifestationskod (anges med asterisk *) eller etiologisk kod (anges med dagger †)	C00-D48†
Ej huvuddiagnos	TEXT	Anger om en kod/koder inte ska användas för att koda huvuddiagnos	Ska inte användas som huvuddiagnos
Kodnivå – kodspe- cifi- kation	TEXT	Anger en kods position i klassifikationens hierarki och kodtyp. Kolumnen finns för att un- derlätta filtrering av innehållet.	Nationell fördjupningskod, femställig (sex tecken med punkt)

U-koder som kan tas i bruk på kort varsel (63 st.) distribueras i en separat fil. U-koder gör det möjligt att på kort varsel implementera en ny kod i respektive system (som vid covid-19) och vi rekommenderar att de inkluderas som ”platshållare” i aktuellt journal- eller informationssystem.